

Amonex tablete (5/10 mg) - Uputa o lijeku

- Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovu uputu.
- Uputu nemojte baciti. Kasnije ćete je možda trebati ponovo pročitati.
- Ako trebate dodatne obavijesti, zatražite ih od svog liječnika ili ljekarnika.
- Liječnik je propisao ovaj lijek samo za Vas. Nemojte ga davati nikomu drugom jer bi mu mogao naškoditi, čak i ako ima simptome jednake Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

U ovoj uputi možete pročitati sljedeće:

1. [Što je Amonex i za što se koristi](#)
2. [Prije nego počnete uzimati Amonex](#)
3. [Kako uzimati Amonex](#)
4. [Moguće nuspojave](#)
5. [Kako čuvati Amonex](#)
6. [Dodatne informacije](#)

1. Što je Amonex i za što se koristi

Djelatna tvar u AMONEX tabletama je amlodipin, lijek koji pripada skupini antagonista kalcija.

AMONEX je lijek koji se upotrebljava u liječenju visokog krvnog tlaka (hipertenzija) i određenih vrsta bolova u prsnom košu (angina pektoris, uključujući i rijetku vrstu nazvanu Prinzmetalova angina).

Kod bolesnika s hipertenzijom, AMONEX snižava visoki krvni tlak tako da opušta krvne žile u tijelu i na taj način pospješuje protok krvi kroz njih. Kod bolesnika s anginom pektoris, AMONEX poboljšava opskrbu srčanog mišića kisikom i na taj način sprječava napad boli u prsnom košu. AMONEX ne pruža trenutačno olakšanje kada se bol u prsnom košu već razvila.

2. Prije nego počnete uzimati Amonex

Nemojte uzimati Amonex:

- ako ste preosjetljivi na amlodipin ili druge antagoniste kalcija, odnosno na bilo

koji od sastojaka ovoga lijeka, što se može očitovati svrbežom, crvenilom kože ili poteškoćama u disanju

- ako bolujete od kardiogenog šoka, stenoze aorte (suženje na aortalnom srčanom zalistku) ili nestabilne angine pektoris (s izuzetkom Prinzmetalove angine pektoris)
- ako ste trudni ili dojite.

Ženama u reproduktivnoj dobi se preporučuje primjena odgovarajuće kontracepcije.

Budite oprezni s Amonex tabletama:

- ako ste nedavno (unazad mjesec dana) preboljeli srčani udar
- ako je došlo do naglog porasta krvnog tlaka do visokih vrijednosti (hipertenzivna kriza)
- ako imate bolest jetre

Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas ili, pak, niste sigurni, javite se svom liječniku.

Uzimanje drugih lijekova s Amonex tabletama

Obavijestite svog liječnika o svim lijekovima koje uzimate ili ste nedavno uzimali, uključujući i one koje ste kupili bez recepta. Ukoliko ste zaprimljeni u bolnicu, obavijestite nadležnog liječnika da uzimate AMONEX kao i o bilo kojim drugim lijekovima koje uzimate.

Uzimanje hrane i pića s Amonex tabletama

AMONEX tablete se mogu uzimati sa ili bez hrane te se trebaju progutati cijele s vodom. Tijekom primjene AMONEX tableta ne bi trebalo konzumirati grejp i sok od grejpa jer može doći do porasta razine djelatne tvari amlodipina u krvi s pojačanim učinkom na snižavanje krvnog tlaka.

Djeca

Ne preporučuje se primjena AMONEX tableta u djece.

Trudnoća i dojenje

Pitajte svog liječnika ili ljekarnika za savjet prije nego počnete koristiti bilo koji lijek.

AMONEX se ne smije primjenjivati u trudnica ili majki koje doje, kao ni u žena u

reproduktivnoj dobi koje ne koriste odgovarajuću kontracepciju.

Upravljanje vozilima i strojevima

AMONEX ne utječe na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

3. Kako uzimati Amonex

Važno je da uzimate lijek onako kako Vam je odredio Vaš liječnik. Ako niste sigurni kako trebate uzimati ovaj lijek, zatražite savjet od svojeg liječnika ili ljekarnika.

Uobičajeno je uzimati jednu AMONEX tabletu na dan.

Tabletu treba progutati cijelu s vodom, redovito svaki dan u isto vrijeme. Nemojte uzimati AMONEX tabletu sa sokom od grejpa.

Redovito provjeravajte imate li dovoljno tableta i pazite da Vam ne ponestanu.

Ako uzmete više Amonex tableta nego što ste trebali

Previše tableta odjedanput može Vam naškoditi. Stoga se što hitnije javite svom liječniku ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi. Kutiju AMONEX tableta ponesite sa sobom kako bi zdravstveni djelatnici kojima se obratite znali točno koji ste lijek uzeli.

Ako ste zaboravili uzeti Amonex

Ukoliko ste propustili uzeti AMONEX tabletu u određeno vrijeme, nastavite sa sljedećom uobičajenom dozom. Nemojte uzimati dvostruku dozu da nadoknadite onu koju ste propustili.

Ako prestanete uzimati Amonex

Vaš liječnik će Vas savjetovati o duljini primjene AMONEX tableta. Ako ranije prestanete uzimati lijek Vaše stanje se može pogoršati.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom AMONEX tableta obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi AMONEX može izazvati nuspojave.

Odmah se javite liječniku ako primijetite neki od sljedećih simptoma, koji su vrlo rijetki, ali mogu biti ozbiljni:

- zviždanje u prsnom košu
- otežano disanje
- otekline vjeđa, lica ili usana
- osip ili svrbež (osobito ako je zahvaćeno cijelo tijelo)

Tijekom primjene ovog lijeka možete primijetiti sljedeće nuspojave:

Često (pojavljuju se u manje od 1 na 10 bolesnika koji uzimaju lijek):

- glavobolja, omaglica, pospanost
- palpitacije (osjećaj lupanja srca)
- navale crvenila
- bol u trbuhu, mučnina
- otekline gležnjeva
- umor

Manje često (pojavljuju se u manje od 1 na 100 bolesnika koji uzimaju lijek):

- promjene raspoloženja, nesanica
- drhtanje, promjene osjeta okusa, malaksalost, slabost
- poremećaji vida, zvonjava u ušima
- snižen krvni tlak
- kratkoća daha, kihanje/curenje iz nosa
- promjene navike pražnjenja crijeva, smetnje probave, suhoća usta, povraćanje
- ispadanje kose, pojačano znojenje, svrbež kože, crvene mrlje na koži
- učestalo mokrenje, osobito noću, nemogućnost postizanja erekcije
- bol u prsima, slabost, loše osjećanje
- bolovi u mišićima i zglobovima, mišićni grčevi, bol u leđima
- povećanje ili smanjenje tjelesne mase
- povećanje grudi u muškaraca

Vrlo rijetko (pojavljuju se u manje od 1 na 10 000 bolesnika koji uzimaju lijek)

- pojava modrica i krvarenja (oštećenje crvenih krvnih stanica)
- teške kožne reakcije
- povišena razina šećera u krvi (šećerna bolest)
- povećana osjetljivost kože, trnci, gubitak osjećaja boli
- srčani udar

- urtikarija (koprivnjača)
- nadutost (gastritis)
- kašalj
- upala gušterače
- poremećaj funkcije jetre, upala jetre, žutica, povišena razina jetrenih enzima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Amonex

AMONEX tablete morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece!

Čuvati pri temperaturi do 25°C.

Lijek se ne smije primijeniti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju!

Lijekovi se ne smiju odlagati putem kućnih otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte ljekarnika kako odlagati lijekove koje više ne trebate. Takvim ponašanjem čuvamo naš okoliš.

6. Dodatne informacije

Što Amonex sadrži?

Djelatna tvar je amlodipin.

Jedna tableta sadržava 5, odnosno 10 mg amlodipina u obliku amlodipinbesilata.

Pomoćne tvari:

- celuloza, mikrokristalična; kalcijev hidrogenfosfat, bezvodni; natrijev škroboglikolat, vrste A; magnezijev stearat.

Kako Amonex tableta izgleda i sadržaj pakiranja?

AMONEX 5 mg tablete: bijela, okrugla tableta, s razdjelnim urezom na jednoj strani i otisnutom oznakom „5“ na drugoj strani.

30 (1x30) tableta u PVC/Al blisteru, u kutiji.

60 (2x30) tableta u PVC/Al blisteru, u kutiji.

90 (3x30) tableta u PVC/Al blisteru, u kutiji.

AMONEX 10 mg: bijela, okrugla tableta, s razdjelnim urezom na jednoj strani i otisnutom oznakom „10“ na drugoj strani.

30 (1x30) tableta u PVC/Al blisteru, u kutiji.

60 (2x30) tableta u PVC/Al blisteru, u kutiji.

90 (3x30) tableta u PVC/Al blisteru, u kutiji.

Napomene:

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje u promet/ proizvođača lijeka

BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d. Ulica Danica 5 48 000 Koprivnica, Hrvatska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Na recept, u ljekarni.