

## Escontral tablete (5 mg) - Uputa o lijeku

- Molimo vas da pažljivo pročitate cijelu uputu prije nego počnete koristiti lijek.
- Čuvajte uputu. Možda je ponovno zatrebate.
- Ako imate dodatna pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj lijek propisan je vama osobno i nemojte ga davati drugim osobama. Može im naškoditi čak i ako su njihovi simptomi isti kao vaši.

### Uputa sadrži:

1. [Što su Escontral tablete i za što se koriste](#)
2. [Prije nego počnete koristiti Escontral tablete](#)
3. [Kako koristiti Escontral tablete](#)
4. [Moguće nuspojave](#)
5. [Kako čuvati Escontral tablete](#)
6. [Dodatne informacije](#)

### 1. Što su Escontral tablete i za što se koriste

ESCONTRAL je lijek protiv alergije koji ne izaziva pospanost. Pomaže u kontroli alergijske reakcije i njezinih simptoma.

ESCONTRAL ublažava simptome alergijskog rinitisa (na primjer, kod peludne groznice i alergije na grinje) kao što su kihanje, curenje nosa, svrbež nosa ili nepca te svrbež, crvenilo i suženje očiju.

ESCONTRAL se također koristi za ublažavanje simptoma povezanih s kroničnom idiopatskom urtikarijom, kao što su svrbež i osip.

Simptomi su ublaženi tijekom čitavog dana, što Vam pomaže da nastavite s normalnim životom.

### 2. Prije nego počnete koristiti Escontral tablete

#### Nemojte uzimati Escontral tablete:

- ako ste alergični na desloratadin, na bilo koji od ostalih sastojaka lijeka ili na loratadin.

ESCONTRAL 5 mg tablete indicirane su u odraslih i adolescenata (u dobi od 12 godina i više).

## **Uzimanje drugih lijekova s Escontral tabletama**

Obavijestite liječnika ili ljekarnika ako koristite ili ste nedavno koristili neke druge lijekove, pa i one lijekove koje vam nije propisao liječnik.

Interakcije ESCONTRALa s drugim lijekovima nisu poznate.

## **Uzimanje Escontrala uz hranu i piće**

ESCONTRAL se može uzeti uz obrok ili na prazan želudac.

## **Trudnoća**

Ako ste trudni, ne preporučuje se uzimanje ESCONTRALa.

Upitajte Vašeg liječnika ili ljekarnika za savjet prije uzimanja bilo kakvog lijeka za vrijeme trudnoće.

## **Dojenje**

Upitajte Vašeg liječnika ili ljekarnika za savjet prije uzimanja bilo kakvog lijeka. Ukoliko dojite, ne preporučuje se uzimanje ESCONTRALa.

## **Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima**

Ako se uzme u preporučenoj dozi, ESCONTRAL ne bi trebao izazvati pospanost ili smanjenje budnosti niti utjecati na Vašu sposobnost upravljanja motornim vozilima ili strojevima. Međutim, vrlo rijetko neke osobe mogu osjetiti pospanost, koja može utjecati na njihovu koncentraciju.

## **3. Kako koristiti Escontral tablete**

Slijedite navedene upute, osim ako vam liječnik nije dao druge upute. Ne zaboravite koristiti lijek. Liječnik će vas uputiti koliko dugo trebate koristiti

### **Odrasli i adolescenti (u dobi od 12 godina i više):**

Uzmite jednu tabletu jedanput dnevno. Progutajte čitavu tabletu s vodom, uz obrok ili na prazan želudac. Uzimajte tablete onoliko dugo koliko Vam je to preporučio liječnik.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ESCONTRALa obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

## **Ako uzmete više lijeka nego što ste trebali**

Uzimajte ESCONTRAL samo na nač in kako Vam je propisano. Ne biste trebali imati ozbiljnih problema kod slučajnog predoziranja. Međutim, ako ste uzeli više ESCONTRALa nego Vam je propisano, obratite se svojem liječniku ili ljekarniku.

## **Ako ste zaboravili Escontral tablete**

Nemojte primjeniti dvostruku dozu kako bi nadoknadili propuštenu!

Primjenite lijek što prije i onda nastavite korištenje prema uobičajenom rasporedu. Međutim, ako vam je ostalo nekoliko sati do sljedeće primjene, nemojte primjeniti propuštenu nego pričekajte vrijeme za sljedeću primjenu.

## **4. Moguće nuspojave**

Kao i svi ostali lijekovi i ESCONTRAL može izazvati nuspojave.

U odraslih nuspojave su usporedive s nuspojavama nakon uzimanja placeba. Međutim, umor, suha usta i glavobolja prijavljene su češće nego nakon uzimanja placeba.

Nakon stavljanja ESCONTRALa u promet, vrlo rijetko prijavljeni su slučajevi teške alergijske reakcije (otežano disanje, hripanje, svrbež, osip, otok) i osip.

Također, vrlo rijetko prijavljeni su slučajevi palpitacija, ubrzanog kucanja srca, boli u trbuhu, mučnine (loše osjećanje), povraćanja, nadraženog želuca, proljeva, vrtoglavice i abnormalnih testova jetrene funkcije.

O svakoj nuspojavi potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

## **5. Kako čuvati Escontral tablete**

Čuvati pri temperaturi do 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju zaštićeno od svjetla. Čuvajte ih izvan dohvata i pogleda djece!

Lijek se ne smije upotrebljavati nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju!

Lijekovi se ne smiju odbacivati u odvod ili kućno smeće. Pitajte Vašeg ljekarnika kako odložiti lijek koji više ne trebate. Ove mjere pridonose zaštiti okoliša.

## **6. Dodatne informacije**

### **Što Escontral tablete sadrže?**

Svaka ESCONTRAL filmom obložena tableta sadržava 5 mg desloratadina.

Pomoćne tvari:

- jezgra tablete - celuloza, mikrokristalič na; magnezijev oksid teški; preželatinirani škrob; laktoza, bezvodna; hipromeloza, 4000 CR; cinkov stearat
- film ovojnica - Opadry blue 03B90819; hipromeloza; titanijev dioksid (E171); makrogol 400; boja Indigocarmine (E132)

### **Kako Escontral tablete izgledaju i sadržaj pakiranja?**

ESCONTRAL 5 mg su plave, okrugle, filmom obložene tablete s utisnutim slovom "D" samo s jedne strane.

Tablete se nalaze u blisterima (PVC/PCTFE//Al) u kutiji; kutije sadržavaju po 30 tableta.

### **Napomene:**

#### **Ime i adresa nositelja odobrenja:**

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Hrvatska

#### **Ime i adresa proizvođača lijeka:**

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Hrvatska

#### **Način i mjesto izdavanja lijeka:**

Na recept, u ljekarni.