

## Zinnat tablete (125/250/500mg) - Uputa o lijeku



**Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek jer sadrži Vama važne podatke.**

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovo pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

### **Što se nalazi u ovoj uputi:**

1. [Što je Zinnat i za što se koristi](#)
2. [Što morate znati prije nego počnete uzimati Zinnat](#)
3. [Kako uzimati Zinnat](#)
4. [Moguće nuspojave](#)
5. [Kako čuvati Zinnat](#)
6. [Sadržaj pakiranja i druge informacije](#)

## 1. Što je Zinnat i za što se koristi

Zinnat je antibiotik koji se koristi u odraslih i djece. Djeluje tako da ubija bakterije koje uzrokuju infekcije. Pripada skupini lijekova koje zovemo cefalosporini.

### Zinnat se koristi za liječenje sljedećih infekcija:

- grla sinusa
- srednjeg uha
- pluća ili prsišta urinarnog trakta
- kože i mekih tkiva

### Zinnat se može koristiti i:

- za liječenje Lajmske bolesti (infekcija koju prenose paraziti krpelji)

## 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Zinnat

### Nemojte uzimati Zinnat

- ako ste alergični (*preosjetljivi*) na bilo koji cefalosporinski antibiotik ili bilo koji drugi sastojak lijeka Zinnat (naveden u dijelu 6).
- ako ste ikad imali tešku alergijsku reakciju (reakciju preosjetljivosti) na bilo koji drugi beta-laktamski antibiotik (penicilini, monobaktami, karbapenemi).

Ako mislite da se nešto od navedenog odnosi na Vas, nemojte uzimati Zinnat dok se ne posavjetujete s Vašim liječnikom.

### Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Zinnat.

Tijekom uzimanja Zinnata morate paziti na određene znakove bolesti, kao što su alergijske reakcije, gljivične infekcije (kao što je *candida*) i jaki proljev (*pseudomembranous colitis*).

To će umanjiti rizik od bilo kakvih problema. Pogledajte "Stanja na koja trebate obratiti pažnju" u odjeljku 4.

### Djeca i adolescenti

Zinnat se ne preporučuje za djecu u dobi do 3 mjeseca, budući da sigurnost i

učinkovitost nisu poznati u ovoj dobnoj skupini.

Za primjenu u djece prikladnija je primjena Zinnat oralne suspenzije.

Za postizanje preporučenih doza lijeka po kg tjelesne mase u djece tjelesne mase

### **Pretrage krvi**

Zinnat može utjecati na rezultate testova razine šećera u krvi ili na krvnu pretragu Coombsov test. Ako Vam je potrebna krvna pretraga:

Obavijestite osobu koja uzima uzorak krvi da uzimate Zinnat.

### **Drugi lijekovi i Zinnat**

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. To uključuje i lijekove koji se mogu nabaviti bez recepta.

Lijekovi koji se koriste za smanjivanje količine kiseline u želucu (npr. *antacidi* koji se koriste u liječenju žgaravice) mogu utjecati na djelovanje Zinnata.

- Probenecid
- Oralni antikoagulansi

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate bilo koji lijek kao što je ovaj.

#### **• Kontracepcijske pilule**

Zinnat može smanjiti učinkovitost kontracepcijskih pilula.

Ako uzimate kontracepcijske pilule za vrijeme liječenja potrebno je dodatno koristiti barijernu metodu kontracepcije (kao što su prezervativi). Upitajte svog liječnika za savjet.

### **Trudnoća, dojenje i plodnost**

Obavijestite Vašeg liječnika prije uzimanja Zinnata:

- ako ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni, ili planirate imati dijete ako dojite

Vaš liječnik će procijeniti korist primjene Zinnata tijekom trudnoće za Vas i potencijalni rizik za dijete.

## **Upravljanje vozilima i strojevima**

Zinnat može izazvati omaglicu i druge nuspojave koje Vas čine manje opreznima.

Nemojte voziti ili upravljati strojevima ako se ne osjećate dobro.

## **3. Kako uzimati Zinnat**

Uvijek uzimate Zinnat točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Uzmite Zinnat nakon obroka. To će pomoći da liječenje bude učinkovitije.

Progutajte cijelu tabletu s malo vode.

Tablete nemojte žvakati, drobiti ili prepoloviti - to može smanjiti učinkovitost liječenja.

## **Uobičajena doza**

### **Primjena u odraslih**

Uobičajena doza Zinnata je 250 mg do 500 mg dva puta na dan ovisno o vrsti i težini infekcije.

### **Primjena u djece i adolescenata**

Uobičajena doza Zinnata je 10 mg/kg (do maksimalne doze od 125 mg) do 15 mg/kg (do maksimalne doze od 250 mg) dva puta na dan ovisno o:

- vrsti i težini infekcije.

Za postizanje preporučenih doza lijeka po kg tjelesne mase u djece tjelesne mase

Zinnat se ne preporučuje za djecu u dobi do 3 mjeseca, budući da sigurnost i učinkovitost nisu poznati u ovoj dobnoj skupini.

Ovisno o bolesti i tome kako Vaše dijete reagira na liječenje, početna doza se može promijeniti ili može biti potreban više od jednog tretmana liječenja.

## **Bolesnici s bubrežnim tegobama**

Ako imate problema s bubrezima, Vaš liječnik može promijeniti dozu.

Obratite se Vašem liječniku ako se ovo odnosi na Vas.

### **Ako uzmete više Zinnata nego što ste trebali**

Ako ste uzeli previše Zinnata možete imati neurološke poremećaje, povećana je vjerojatnost napadaja (*konvulzija*).

Ne odugovlačite. Obratite se Vašem liječniku, ili odjelu hitne službe u najbližoj bolnici.

Ako ste u mogućnosti pokažite im kutiju Zinnata.

### **Ako ste zaboravili uzeti Zinnat**

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Samo uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme.

### **Ako prestanete uzimati Zinnat**

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Nemojte prekidati uzimanje Zinnata bez savjetovanja s liječnikom.

Važno je da uzmete cijelu terapiju Zinnata. Nemojte prestati ako Vam liječnik nije tako preporučio iako se osjećate bolje. Ako ne završite cijeli tretman liječenja, infekcija se može vratiti.

## **4. Moguće nuspojave**

Kao i svi drugi lijekovi, Zinnat može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

### **Stanja o kojima treba voditi računa**

Mali broj ljudi koji uzimaju Zinnat mogu dobiti alergijsku reakciju ili potencijalno ozbiljnu **kožnu reakciju**.

### **Simptomi uključuju:**

- **tešku alergijsku reakciju**. Znakovi uključuju **uzdignuti osip praćen svrbežom, oticanje**, ponekad lica i usta što može uzrokovati **teškoće pri disanju**.

- **kožni osip**, koji može imati mjehuriće, te izgleda kao **male mete** (središnje tamne točke uokvirene sa svijetlim dijelovima te tamnijim prstenom na rubu)
- **rašireni osip s mjehurićima i ljuštenjem kože** (to mogu biti znakovi Stevens-Johnson sindroma ili toksične epidermalne nekrolize)
- **gljivičnu infekciju**. Lijekovi poput Zinnata mogu izazvati bujanje gljivica (*Candida*) u tijelu što dovodi do gljivične infekcije. Ove nuspojave su vjerojatnije ako se Zinnat uzima duže vrijeme.
- **težak proljev** (*Pseudomembranous colitis*). Lijekovi poput Zinnata mogu izazvati upalu debelog crijeva što uzrokuje jaki proljev, obično s krvi ili sluzi, bolove u želucu i vrućicu.
- **Jarisch-Herxheimer reakcija**. Neki bolesnici mogu dobiti visoku temperaturu (vrućicu), chills, glavobolju, bolove u mišićima i osip za vrijeme liječenja Lajmske bolesti Zinnatom. To je poznato kao Jarisch-Herxheimer reakcija. Simptomi obično traju nekoliko sati ili do jedan dan.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika.

**Česte nuspojave** (Ove se mogu javiti kod više od 1 na 10 osoba):

- gljivične infekcije
- glavobolja
- omaglica
- proljev
- mučnina
- bolovi u trbuhu

**Česte nuspojave koje se mogu pokazati u pretragama krvi:**

- porast bijelih krvnih stanica (*eozinofilija*)
- porast jetrenih enzima

**Manje česte nuspojave** (Ove se mogu javiti kod više od 1 na 100 osoba):

- povraćanje
- kožni osip

**Manje česte nuspojave koje se mogu pokazati u pretragama krvi:**

- smanjenje broja krvnih pločica (stanice koje pomažu zgrušavanju krvi)
- smanjenje broja bijelih krvnih stanica
- pozitivan Coombs-ov test

## Ostale nuspojave

Ostale nuspojave su se pojavile kod malog broja ljudi, ali njihova točna učestalost nije poznata.

- teški proljev (*pseudomembranous colitis*)
- alergijske reakcije
- kožne reakcije (uključujući i one teške)
- visoka temperatura (vrućica)
- žuta boja bjeloočnica ili kože upala jetre (*hepatitis*)

## Nuspojave koje se mogu pokazati u pretragama krvi:

- prebrzo uništavanje crvenih krvnih stanica (hemolitička anemija)

## Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava:

Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Odsjek za farmakovigilanciju,

Roberta Frangeša Mihanovića 9 10 000 Zagreb Republika Hrvatska

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

## 5. Kako čuvati Zinnat

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

**Zinnat tablete** čuvajte na temperaturi ispod 30°C.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša .

## 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

## Što Zinnat sadrži

Djelatna tvar: cefuroksim u obliku cefuroksimaksetila.

**1 Zinnat 125 mg tableta** sadrži 125 mg cefuroksima u obliku cefuroksimaksetila.

**1 Zinnat 250 mg tableta** sadrži 250 mg cefuroksima u obliku cefuroksimaksetila.

**1 Zinnat 500 mg tableta** sadrži 500 mg cefuroksima u obliku cefuroksimaksetila.

Pomoćne tvari su:

- celuloza, mikrokristalična; karmelozanatrij, umrežena, tip A; natrijev laurilsulfat; biljno ulje hidrogenirano; silicijev dioksid, koloidni, bezvodni.
- Ovojnica sadrži hipromelozu; propilenglikol; metilparahidroksibenzoat; propilparahidroksibenzoat; titanijev dioksid (E171) i natrijev benzoat (E211).

## Kako Zinnat izgleda i sadržaj pakiranja

Zinnat 125 mg tablete su bijele, filmom obložene tablete oblika kapsule s utisnutom oznakom «GXES5»s jedne strane. Pakirane su u kutiji, s po 10 tableta u blisteru.

Zinnat 250 mg tablete su bijele, filmom obložene tablete oblika kapsule s utisnutom oznakom «GXES7»s jedne strane. Pakirane su u kutiji, s po 10 tableta u blisteru.

Zinnat 500 mg tablete su bijele, filmom obložene tablete oblika kapsule s utisnutom oznakom «GXEG2»s jedne strane. Pakirane su u kutiji, s po 10 tableta u blisteru.

## Napomene:

### Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

GlaxoSmithKline d.o.o. Ulica Damira Tomljanovića Gavrana 15 10020 Zagreb Hrvatska

### Proizvođač:

Glaxo Operations UK Ltd. (posluje kao Glaxo Wellcome Operations) Harmire Road, Barnard Castle, County Durham DL12 8DT Velika Britanija

### Mjesto i način izdavanja lijeka

Na recept, u ljekarni.