



Krv u stolici kod pasa - uzroci, krvavi proljev, sluzava krvava stolica, dijagnoza i liječenje



Krv u stolici kod pasa ili hematohezija može biti **simptom različitih stanja i bolesti** u psećem organizmu, a najčešće su **povezane sa zdravljem debelog crijeva i anusa**. Pojava [svježe \(crvene\) krvi u stolici](#) može biti **popraćena drugim simptomima** kao što su sluz u stolici i proljev.

Važno je obratiti pozornost na sve simptome i **što prije otići veterinaru** kako bi se utvrdio točan **uzrok o kojem ovisi liječenje**.



Krv u stolici kod pasa - uzroci

Ako pas ima krvavu stolicu, treba uzeti u obzir sljedeće uzroke:

- **intolerancija određene vrste hrane** - namirnice koje nisu namijenjene psu, a sadrže puno začina, konzervansa i aditiva, pokvarena hrana,
- **oštećena crijeva** - ako pas pojede oštar predmet (kosti, plastika, igla itd.),
- **paraziti** - u pseći organizam dopijevaju kroz hranu i vodu,
- **bakterijske i virusne infekcije** - najčešće su *Clostridium*, *Salmonella* i parvoviroza (krv u stolici šteneta, virus koji kod štenadi uzrokuje kolabiranje organizma),
- **polipi u crijevima** - benigni su, ali mogu iritirati crijeva,
- **ozljeda ili infekcija anusa,**

- **suženje crijeva ili anusa** - [upalna bolest crijeva](#) (kolitis),
- **reakcija na određenu traumu**,
- **upala analnih vrećica** - ako njihov sadržaj postane krvav,
- **rak crijeva** - pojavljuje se rjeđe, kod starih pasa,
- **trovanje** - npr. otrovom za štakore itd.



Krv u stolici kod pasa - simptomi

Što se **popratnih simptoma** tiče, oni **ovise o uzroku**, a mogu biti sljedeći:

- intenzivna [drhtavica](#),
- [povraćanje](#),
- gubitak apetita,
- [dehidracija](#),
- neuhranjenost,
- opća slabost,
- bljedilo vidljivih sluznica,

- [gliste u stolici](#),
- [proljev](#),
- [tvrda stolica](#),
- [sluz u stolici](#),
- akutno proširenje krvnih žila,
- [pad krvnog tlaka](#),
- [hematomi](#).



Pas - krvavi proljev

Navedeni simptomi mogu se javiti i kad su u pitanju **proljev i krv** kod pasa. Naime, ako krvavi proljev kod pasa **prate bezvoljnost i [povišena temperatura](#)**, važno je **odmah se obratiti veterinaru** jer može biti riječ o [životno opasnoj bolesti](#).

Maltezer - krv u stolici

Povraćanje krvi i krv u stolici simptomi su životno ugroženog stanja koje **najčešće**

pogađa [male pse](#) srednje dobi. Neophodna je **hitna hospitalizacija** i agresivno **nadoknađivanje tekućine** zbog dehidracije.



Krvava sluz u stolici kod pasa

Sluzava krvava stolica kod pasa najčešće je simptom **poremećaja probavnog sustava**, posebno debelog crijeva. [Upala debelog crijeva](#) onemogućava pravilnu apsorpciju vode što otežava zadržavanje stolice.

Zbog **oštećenja sluznice crijeva** izlučuju se **velike količine sluzi**, čak i **krvi**. Također, kolitis može usporiti pokrete debelog crijeva pa **sadržaj brzo prolazi** i nastaje proljev. Najčešći **uzroci kolitisa** su:

- paraziti,
- bakterijska infekcija,
- [stres](#),
- tumori,

- [polipi](#).

Ne treba zabrinjavati mala količina sluzi u psećoj stolici jer **sluz podmazuje i vlaži sluznicu debelog crijeva.**



Krv u stolici kod pasa - dijagnoza

Kod pojave krvi u stolici **veterinar** mora **ispitati** vlasnika o **prehrani, ponašanju i navikama psa**. Dijagnostičke **pretrage** uključuju:

- [ultrazvuk](#),
- **rendgen**,
- [endoskopiju](#) - u [općoj anesteziji](#) (inhalacija).

Krv u stolici kod pasa - liječenje

Ako se uoči krv u psećoj stolici, važno je pobrinuti se **da pas bude dobrog općeg stanja** što uključuje **nadoknadu tekućine** i elektrolita, održavanje normalne tjelesne temperature i **medicinsku prehranu**.

Prije svega, treba **utvrditi uzrok**. Za probavne poremećaje koristi se za to namijenjena hrana, a za intolerancije **hipoalergena hrana**. U slučaju proljeva i povraćanja, dobro je davati psu **rižu** koja će **umiriti sluznicu crijeva**.



Ako **pas stolicom izbac**i oštar predmet koji je pojeo, **krvarenje će prestati**. Zato je važno provjeravati stolicu. S druge strane, kad je riječ o **parazitima**, oni zahtijevaju adekvatnu **terapiju**.

Razne **bakterijske i virusne infekcije** mogu se liječiti **antibioticima**. Što se **polipa** tiče, ako ne uspije **regulacija prehranom**, nameće se **kirurško odstranjivanje**. Ozljedu ili infekciju anusa važno je sanirati i zaustaviti krvarenje.

Liječenje raka crijeva ovisi o fazi bolesti i zahvaćenosti tkiva (operacija ili **kemoterapija**). Kad je **trovanje** u pitanju, psu treba **dati mlijeko** i što prije ga **odvesti veterinaru**.